

فرمولاسیون این دارو بر اساس **جذب فوق العاده یون آهن** و **عدم بروز عوارض جانبی** است. این برند، دارای پتنت آمریکا و با طراحی دکتر امید رجبی کبودچشمه عضو انجمن طب گیاهی انگلستان و انجمن داروهای طبیعی آمریکا می باشد. شربت فروتونیک در دانشکده ها و مراکز مختلف مورد مطالعه و ارزیابی بالینی و آزمایشگاهی قرار گرفته است که نتایج حاصله، جالب و بی بدیل و با درجه رضایت مندی بالا گزارش شد.

آزمایشات بالینی



نتایج ۳ نمونه آزمایش فاکتورهای خون

در سه بیمار با کدهای ۱ تا ۳ با حذف فرآورده های گوشتی و تنها از طریق رژیم خام گیاه خواری قبل و (حدود ۴۰ الی ۵۰ روز) بعد از مصرف شربت فروتونیک به شرح ذیل است که این رشد، نشان دهنده خون سازی و تحریک تولید فاکتورهای خونی است.

پلاکت Plt	هماتوکریت Hct	هموگلوبین Hb	گلبول های قرمز RBC	گلبول های سفید WBC	فاکتورهای خون	
211000	34.8	11.6	3.76	5000	95/9/22	بیمار کد ۱ (پیوند کلیه ناموفق)
212000	39	13.3	4.21	6300	95/11/16	
40000	20.1	6.7	2.15	6500	96/3/22	بیمار کد ۲ (سرطان رحم متاستاتیک end stage)
268000	29.7	9.8	3.07	15410	96/4/26	
157000	41.4	13.1	4.56	8300	96/6/15	بیمار کد ۳ (کاندیدای دیالیز)
244000	45.8	14.4	5.12	9800	96/7/29	



"مطالعات بالینی" در مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، مصرف شربت فروتونیک توسط ۱۶۳ نفر از مراجعین، زیر نظر آقای دکتر غلام حسین حسن شاهی متخصص خون شناسی و تیم تحقیقاتی ایشان در سال ۸۹ انجام شد. نتایج حاصله به این ترتیب گزارش شد:

Hct	Hb	Ferritin	کد
% 41.50	14	151	156
% 41.30	14	105	157
% 41.50	14	213	158
% 36.10	12.1	99	159
% 34.00	11.5	196	160
% 30.20	10.2	105	161
% 31.00	10.6	138	162
% 37.20	12.6	115	163
0.419673	12.98429	165.1963	میانگین
0.289826	1.328114	81.29978	

Hct	Hb	Ferritin	کد
% 35.50	12	37	156
% 36.80	12.2	83	157
% 35.30	11.8	22	158
% 29.20	9.4	88	159
% 22.40	8.3	30	160
% 24.80	8.5	5	161
% 25.30	8.6	21	162
% 24.20	8.1	22	163
0.311958896	10.56134969	52.78527607	میانگین
0.050634862	1.433187924	45.33430591	

نتایج آزمایشات دانشگاه علوم پزشکی ، ۴۰ روز پس از مصرف فروتونیک:

میانگین هماتوکریت (Hct) حدود ۱.۳۵ برابر و میانگین فریتین (Ferritin) بیش از ۳ برابر و میانگین هموگلوبین حدود ۱.۲۳ برابر شده است.